

Kat

Milde pijn

Matige pijn

Ernstige pijn

Zeer ernstige pijn

NSAID
Tenzij contra-indicatie
Maa i.c.m. alle middelen uit dit schema

Naar huis?

NSAID

Onvoldoende effect?

Contra-indicatie NSAID?

Snel effect

Methadone

Buprenorfine

Onvoldoende effect?

Onvoldoende effect?

Naar huis?

Let op: 4x daags een bittere pil ingeven!

Tramadol

Evt.
i.c.m

NSAID

Pas 4-6u na buprenorfine gift

Werkt pas na 6-8u

Pijnscoren voordat kat naar huis mag

Fentanyl
patch

Evt.
i.c.m

NSAID

Methadone +
Ketamine CRI

Fentanyl CRI

Onvoldoende effect?

Buprenorfine +
Dexmedetomidine CRI

Onvoldoende effect?

Buprenorfine +
Ketamine CRI

Onvoldoende effect?

Naar huis?

Werkt pas na 6-8u
Pijnscoren voordat kat naar huis mag

Fentanyl
patch

Evt.
i.c.m

NSAID

Fentanyl CRI
+
Ketamine CRI

Buprenorfine +
Dexmedetomidine CRI +
Ketamine CRI

Naar huis?

NEE

De verschillende mogelijkheden op dit niveau zijn beide even potent, ze hebben hun eigen voor- en nadelen. Bij ongewenst/onvoldoende effect: overstappen.

→ Rode pijl = overstappen van medicatie