



Informatie brief voor de eigenaar: Fentanylpleisters

Wat is een Fentanyl Matrix pleister?

Deze pleister bevat fentanyl. Fentanyl is een krachtige pijnstiller, die ernstige pijn verlicht en zo het herstel van uw huisdier zo prettig en voorspoedig mogelijk kan laten verlopen.

De pleister wordt vaak gebruikt naast andere pijnstillers en kan ook ingezet worden als enige pijnstiller bij patiënten, die problemen hebben met andere pijnstillers of behandelingsmethoden (zoals problemen met de nieren, maag e/o darmen).

De pleister geeft het fentanyl geleidelijk af, waarna het door de huid wordt opgenomen in het bloed. De werkingsduur van de pleister is ongeveer 3 dagen (72 uur) bij de hond en ruim 4 dagen (110 uur) bij de kat.

De pleister is geplaatst op: (datum) (tijd)

De pleister moet verwijderd worden op (ongeveer): (datum) (tijd)

De pleister moet verwijderd worden door uw eigen dierenarts.

Waarschuwingen:

- Pas op met hoge koorts ($> 40^{\circ}\text{C}$): bij hoge temperaturen kunnen de pleisters namelijk meer werkzame stof afgeven aan het lichaam. Overleg in dit geval met ons of uw eigen dierenarts. Zorg er daarom ook voor dat de lichaamsplek waar de pleister zit niet in contact komt met warmtebronnen als kruiken, verwarming etc.
- Houd de pleisters (ook de *gebruikte* pleisters) altijd buiten het bereik van kinderen
- Voorkom dat uw hond of kat (of andere dieren in huis) met zijn bek in contact komt met de pleister (bijten, likken)
- Indien uw huisdier andere geneesmiddelen krijgt, raadpleeg dan uw dierenarts. Sommige geneesmiddelen mogen namelijk niet gelijktijdig of moeten in aangepaste dosering worden gebruikt. De medicijnen, die wij hebben meegegeven worden niet beïnvloed door de pleister.

Bijwerkingen:

voorkomende ongewenste effecten kunnen zijn:

- huidirritatie met jeuk, roodheid e/o zwelling
- slaperigheid
- verminderde of verhoogde eetlust, eventueel braken
- verlaagde hartfrequentie
- verlaagde of verhoogde lichaamstemperatuur

In zeldzame gevallen (mn in geval van onbedoelde opname) kan een overdosering optreden: het belangrijkste teken van een overdosering is een verminderde ademhaling e/o bewustzijn.

Bel onmiddellijk de dierenarts, wanneer de hond of kat abnormaal langzaam of zwak ademhaalt.

Stimuleer het dier. Indien de dierenarts adviseert de pleister direct te verwijderen: let dan op het volgende: nooit met blote handen de actieve (plak-)zijde van de patch aanraken, na verwijderen de patch dubbelvouwen met de plakzijde naar binnen en doe hem bij het klein chemisch afval.

Handen goed wassen met alleen water na het verwijderen van de patch.

Er is een geneesmiddel beschikbaar om de werking van de pleister op te heffen.

Als U vragen heeft, neemt U dan gerust contact met ons op.

MCD - Spoedkliniek voor Dieren Amsterdam - Telefoonnummer: 020-7.400.600